

BÀI TUYÊN TRUYỀN PHÒNG CHỐNG DỊCH TẢ LỢN CHÂU PHI

Năm 2019, bệnh Dịch tả lợn Châu Phi đã xảy ra trên địa bàn huyện, gây thiệt hại nặng nề cho người chăn nuôi. Hiện nay, tình hình bệnh đang diễn biến hết sức phức tạp. Tại tỉnh ta, bệnh đã xảy ra tại 01 hộ chăn nuôi là hộ ông Lê Bá Đức, thôn Hải Phúc, xã Hoàng Thắng buộc phải tiêu hủy 75 con (trong đó 18 con nái và 57 con lợn choai và lợn thịt). Trong thời gian tới, nếu không có các giải pháp tập trung, đồng bộ để phòng, chống, khống chế dịch bệnh, nguy cơ bệnh dịch tả lợn Châu Phi sẽ bùng phát và lây lan trên diện rộng là rất cao.

Trước diễn biến trên của dịch bệnh Dịch tả lợn Châu Phi, để có biện pháp ngăn chặn, hạn chế thấp nhất dịch lây lan và bùng phát, đề nghị Ban nông nghiệp xã, cán bộ thú y, Trưởng các thôn giám sát chặt chẽ diễn biến dịch bệnh trên địa bàn, quản lý, cung cấp thông tin, khuyến cáo đến các hộ chăn nuôi một số nội dung sau:

1. Đặc điểm chung của bệnh Dịch tả lợn Châu Phi.

Bệnh dịch tả lợn Châu Phi là một bệnh truyền nhiễm nguy hiểm do virus gây ra. Bệnh có đặc điểm lây lan nhanh trên loài lợn (gồm cả lợn nhà và lợn hoang dã); bệnh xảy ra ở mọi lứa tuổi và mọi loại lợn. Bệnh gây thiệt hại nghiêm trọng với tỷ lệ chết lên đến 100%. Virus gây bệnh Dịch tả lợn Châu Phi có sức đề kháng cao trong môi trường. Sau khi khỏi bệnh lâm sàng, lợn vẫn có khả năng mang virus trong thời gian dài và có thể trở thành vật mang trùng suốt đời. Do vậy, nếu để xảy ra bệnh sẽ rất khó để loại trừ được mầm bệnh. Hiện nay chưa có vacxin phòng bệnh và không có thuốc điều trị.

2. Triệu chứng.

- Thể quá cấp tính: lợn sẽ chết nhanh, không biểu hiện triệu chứng hoặc lợn sẽ nằm và sốt cao trước khi chết.

- Thể cấp tính: lợn sốt cao 40,5 – 42⁰C. Lợn không ăn, lười vận động, ủ rũ, nằm chõng đống lên nhau, lợn thích nằm chỗ bóng tối hoặc gần nước. Lợn có biểu hiện đau vùng bụng, lưng cong, di chuyển bất thường, một số vùng da trắng chuyển sang màu đỏ, đặc biệt là ở vành tai, đuôi, cẳng chân, da phần dưới vùng ngực và bụng, có thể có màu xanh tím.

- Thể á cấp tính: lợn biểu hiện triệu chứng không nghiêm trọng. Lợn sốt nhẹ hoặc sốt lúc tăng lúc giảm, giảm ăn, sụt cân, ủ rũ, viêm toàn bộ phổi nên khó thở, ho có đờm, phổi có thể bội nhiễm vi khuẩn kế phát, viêm khớp, vận động khó khăn.

- Thể mãn: lợn có nhiều triệu chứng khác nhau, chẳng hạn như giảm cân, sốt không ổn định, có triệu chứng hô hấp, hoại tử da, hoặc viêm loét da mãn tính, viêm

khớp, viêm cơ tim, viêm phổi dính sườn, viêm các khớp khác nhau trong giai đoạn phát triển.

3. Biện pháp phòng, chống bệnh Dịch tả lợn Châu Phi.

- Trường hợp có dịch xảy ra trên địa bàn: Vùng bị dịch uy hiếp, vùng đệm thực hiện nghiêm việc vệ sinh tiêu độc khử trùng, phun toàn xã 2 lần/tuần, các hộ chăn nuôi, chợ bán thịt lợn, hộ giết mổ, hộ bán khám phun 1-2lần/ngày.

- Kiểm soát chặt chẽ việc vận chuyển, buôn bán, giết mổ lợn và thịt lợn tại các hộ kinh doanh. Khuyến cáo người dân không tham gia mua bán, vận chuyển, tiêu thụ lợn bệnh, lợn nghi mắc bệnh, các loại sản phẩm thịt lợn bệnh.

- Có biện pháp ngăn chặn, tiêu diệt các loại côn trùng, gặm nhấm (như ruồi, muỗi, chuột, chim trời...) vì chúng có thể là vật trung gian mang mầm bệnh từ nơi này sang nơi khác.

- Mua con giống rõ nguồn gốc; nhập đàn, xuất đàn phải khai báo với địa phương, có giấy tờ xác nhận của địa phương nơi bán; không sử dụng thức ăn thừa, thức ăn tận dụng chưa qua xử lý chín, cho lợn ăn; không cho thương lái, phương tiện vận chuyển vào khu chuồng nuôi vì có thể mang theo mầm bệnh từ nơi khác vào; khám cho lợn ăn mua ở đại lý về phải để ở sân phun thuốc khử trùng rồi mới đưa vào trại; rải vôi bột xung quanh chuồng trại, lối đi vào trại, trước cổng nhà...

- Người chăn nuôi trước và sau khi vào chăn sóc phải thay và sát trùng bảo hộ quần áo, ủng, dụng cụ chăm nuôi trước khi đưa vào chuồng trại phải được tiêu độc khử trùng sạch sẽ. Không nhốt chó, gà và các loại gia súc, gia cầm khác vào khu vực chăn nuôi lợn.

- Thường xuyên tổng vệ sinh, phun thuốc sát trùng khu vực nuôi, khu vực xung quanh; trên các tuyến đường ra vào khu vực trại. Khi có lợn bệnh hoặc nghi mắc bệnh phải báo ngay cho Trưởng thôn và UBND xã để lấy mẫu xét nghiệm; không bán chạy, giết mổ lợn bệnh./.